


ممکن است بارداری مجدد حتی دو هفته بعد از سقط انجام گیرد. برای جلوگیری از آن لازم است با پزشک خود مشورت نموده و روش مناسب و مطمئنی را برای جلوگیری از بارداری انتخاب نماید.



بعد از کورتاژ لازم است قرص های آهن تجویز شده توسط پزشک را به مدت سه ماه برای جبران کم خونی خود استفاده نماید.

در موارد زیر لازم است به پزشک خود مراجعه نمایید:

- تب
- ترشحات زیاد و غیر طبیعی
- درد زیاد در قسمت زیر شکم
- افزایش خونریزی
- ترشحات بد بو
- هر نوع حالت غیر طبیعی مثل سردی، ضعف، بی حالی، تب و...

**\*توجه داشته باشید عمل دیلاتاسیون و کورتاژ هیچ تاثیری در روند زندگی شما ندارد و می توانید بعد از یک هفته استراحت بدون هیچ مشکلی زندگی عادی خود را از سر بگیرید.**

**منبع:** بارداری و زایمان ویلیامز

# دیلاتاسیون و کورتاژ

**واحد آموزش مرکز آموزشی پژوهشی درمانی**


**امام خمینی (ره)**

**اردیبهشت ۱۴۰۳**

**کد سند: p-mn-59**

این بیمارستان یک مرکز آموزشی درمانی می باشد که دارای دانشجویان و فراگیران رشته های پرستاری، مامایی و فوریت می باشد که در شیفتهای متعدد در حال آموزش می باشند و دانشجویان در تمام فرایندهای تشخیص و درمان و مراجعات بعدی شما تحت نظارت مربیان و اعضای هیات علمی نقش دارند.

## موارد خونریزی غیر طبیعی واژن :



## مددجوی عزیز :

- بعد از تماس جنسی
- هنگام یائسگی یا بعد از آن
- در بین دو دوره ی قاعدگی به صورت لکه بینی
- ترشح خونی از واژن یا خونریزی در نیمه اول حاملگی

با سلام و آرزوی سلامتی برای شما امیدواریم از لحظاتی که در کنار شما بودیم رضایت کافی داشته باشید و هر چه سریع تر به آغوش خانواده و جامعه بازگردید. این پمفلت آموزشی جهت افزایش اطلاعات شما در مورد مراقبت های لازم و پیشگیری از عوارض آن در اختیار شما قرار گرفته است .

## دیلاتاسیون و کورتاژ:

باز کردن دهانه رحم و تخلیه نسج آن را گویند. این عمل یکی از شایع ترین عمل های زنان است. می تواند برای تشخیص یا درمان خونریزی های غیر طبیعی زنان به کار رود.

## خونریزی غیر طبیعی از واژن چیست؟

در شرایط مختلف یک زن ممکن است مشکلاتی داشته باشد که منجر به خونریزی غیر طبیعی از واژن گردد. خونریزی غیر طبیعی به خونریزی گفته می شود که در زمانی خارج از انتظار ما اتفاق بیفتد.

## مراقبت های بعد از عمل:

قبل از موارد زیر حتما با پزشک خود مشورت کند:

انجام کارهای سنگین بد از عمل جراحی  
داشتن تماس جنسی بعد از عمل جراحی

در صورتی که عمل شما برای خارج کردن بقایای حاملگی انجام شده، در صورت تمایل به بارداری مجدد لازم است حاملگی خود را تا شش ماه به تاخیر اندازید تا رحم شما آمادگی لازم را پیدا کند و تصمیم گیری برای بارداری مجدد حتما تحت نظر پزشک متخصص زنان انجام شود.

عمل دیلاتاسیون و کورتاژ ضمن بیهوشی عمومی یا بی حسی ناحیه ای، بعد از این که شما را در وضعیت مناسبی قرار دادند که دسترسی به رحم آسان باشد، انجام می شود. ابتدا دهانه رحم را باز می کنند، در صورتی که علت خونریزی سقط است، محصولات حاملگی را خارج می نمایند و اگر علت خونریزی نامعلوم است از بافت رحم نمونه (بیوپسی) بر می دارند. اگر پزشک شما ناحیه مشکوکی را یافت، ممکن است یک بخش یا همه آن را خارج کند و به آزمایشگاه بفرستد. یک آسیب شناس بافت را زیر میکروسکوپ آزمایش می کند تا سرطان یا دیگر بیماری های احتمالی را تشخیص دهد.