



خونریزی نیمه اول حاملگی و سقط

این بیمارستان یک مرکز آموزشی درمانی می باشد که دارای دانشجویان و فراگیران رشته های پرستاری، مامایی و فوریت می باشد که در شیفتهای متعدد در حال آموزش می باشند و دانشجویان در تمام فرایند تشخیص و درمان و مراجعات بعدی شما تحت نظارت مربیان و اعضای هیات علمی نقش دارند.

واحد آموزش

بیمارستان آموزشی پژوهشی درمانی امام خمینی (ره)
شیروان

تاریخ بازنگری: بهار ۱۴۰۵

کدسند: p-mn-71

در بعضی از موارد در مورد سقط های ۱۶- ۲۰ هفته باید دفع جنین به کمک القا زایمان صورت گیرد و ممکن است از روش های طبی و دارویی کمک بگیرند و شما مجبور باشید مدتی را در زایشگاه تحت نظر باشید.

بسیاری از مادران یک دوره اندوه را بعد از سقط تجربه می کنند و در رابطه با توانایی خود به عنوان یک زن احساس ترس و نگرانی دارند و در رابطه با بارداری بعدی خود و یا توانایی بارداری مجدد مضطرب می باشند. می توانید احساسات خود را آزادانه ابراز نمایید.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر پس از ترخیص از بیمارستان می توانید با شماره ۰۱۲-۳۶۲۲۴۰-۱۵ داخلی ۱۲۱ یا ۱۲۸ تماس بگیرید.

منبع:

درسنامه جامع مامایی — زیبا تقی زاده -
کتاب پرستاری مادران و نوزادان لیفر ترجمه زیبا تقی زاده-

اگر جنین بیش از ۴ هفته بصورت مرده داخل رحم بماند احتمال عفونت برای مادر دارد.

حاملگی خارج از رحم:

گاهی اوقات حاملگی در داخل لوله یا تخمدان و یا قسمتی دیگر از بدن ایجاد می شود و چون توانایی رشد را ندارد منجر به سقط می شود.

در حاملگی خارج رحم ممکن است خونریزی کم باشد اما خطرات وخیم تری را برای مادر دارد باید این نوع سقط سریعاً با سونوگرافی و معاینه تشخیص داده شود و اقدام لازم انجام گردد.

مادر عزیز اگر شما با خونریزی مراجعه نموده اید اجازه دهید ماما شما را بطور دقیق معاینه نماید تا علت و میزان خونریزی را دقیقاً تشخیص دهد. گاهی خونریزی از رکتوم یا مجاری ادراری است.

ممکن است به دنبال خونریزی برای شما روش های جراحی نیاز شود.

بطور مثال: در خونریزی و سقط ناقص باید کورتاژ تخلیه ای انجام شود و در حاملگی خارج رحم عمل جراحی شکمی نیاز شود.

خونریزی نیمه اول حاملگی

بسیاری از مادران در نیمه اول بارداری تجربه ای از خونریزی را دارند و یکی از علل شایع مراجعات به زایشگاه است. هرگونه خونریزی در دوران حاملگی غیرعادی بوده و باید علت آن مشخص شود. خونریزی مادر ظرفیت انتقال اکسیژن را کاهش داده و مادر و نوزاد را در معرض خطر قرار می دهد.

خونریزی در سه ماهه اول خطر زایمان زودرس یا کنده شدن جفت را افزایش می دهد.

شایعترین علل خونریزی در نیمه اول بارداری عبارتند از:

- * سقط خودبه خودی
- * پولیپ های سرویکس
- * فیبروئیدهای رحم
- * حاملگی نابجا
- * مول هیداتفرم

انواع سقط و حاملگی خارج رحمی

اگر شما قبل از هفته ۲۰ حاملگی دچار خونریزی شوید

احتمال سقط وجود دارد. سقط به معنی ختم عمدی یا غیرعمدی بارداری قبل از هفته بیستم یعنی زمانی که جنین قابلیت حیات ندارد، می باشد.

علل سقط :

- لقاح و ترکیب غیر عادی سلول های جنسی
- تغییرات ژنی در سلول لقاح شده
- عفونت مادر
- سابقه بیماری خاص مثل دیابت کنترل نشده
- کمبود هورمون پروژسترون
- کم کاری تیروئید
- مصرف دخانیات
- نارسایی دهانه رحم
- سلول های جنسی مسن

انواع سقط :

تهدید به سقط: در این گونه موارد مادر ابتدا خونریزی داشته و سپس درد کرامپی مثل درد قاعدگی در بالای عانه یا در پشت و کمر ایجاد می شود.

اگر درد و خونریزی بیشتر از ۲ روز طول بکشد پیش آگهی بدتر است.

اغلب در ۵۰٪ موارد با این علائم حاملگی ادامه نیافته و محصولات حاملگی دفع می گردد، اما اگر سقط نشود و حاملگی ادامه یابد احتمال زایمان زودرس و نوزاد با وزن پایین زیاد است اما احتمال ناهنجاری افزایش نمی یابد.

سقط اجتناب ناپذیر: در اینگونه موارد علاوه بر

خونریزی، درد شدید نیز مشاهده می شود و جفت و جنین دفع می شود.

سقط فراموش شده: گاهی از مواقع جنین در داخل

رحم رشد نکرده و می میرد اما علائمی از سقط در اوایل ایجاد نمی شود و ممکن است ۱ تا ۳ هفته داخل رحم بماند و سپس علامتی از خونریزی ایجاد شود.

