



عقرب گزیدگی



مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام

خمینی (ره) شیراز

تاریخ بازنگری: اردیبهشت ۱۴۰۵

کد سند: p-mn-50

• کوتاهی و سختی تنفس

• دشواری در بلع

• تورم پلک هاف زبان و لبها

• کاهش فشار خون

• درد شکم

• تشنج

• سرگیجه

این اقدامات نیاز مند اقدامات اورژانسی هستند ، چون

احتمال مرگ فرد وجود دارد .

این بیمارستان یک مرکز آموزشی درمانی می باشد که دارای

دانشجویان و فراگیران رشته های پرستاری، مامایی و فوریت می باشد

که در شیفتهای متعدد در حال آموزش می باشند و دانشجویان در

تمام فرایند تشخیص و درمان و مراجعات بعدی شما تحت نظارت

مربیان و اعضای هیات علمی نقش دارند.

منبع: کتاب فوریتهای پرستاری ملاحظت نیک روان

توجه داشته باشید که فعالیت جسمانی مصدوم باید تا حد امکان محدود شده، بدن گرم نگهداشته شود .

برای تسکین درد می توانید از قرص استامینوفن هر ۴ ساعت یک بار استفاده کنید. از آسپرین یا ایبوبروفن استفاده نکنید . چون ممکن است موجب بروز مشکلات دیگری شود .

آنتی بیوتیک کمکی به درمان نمی کند. مگر اینکه گزیدگی دچار عفونت ثانوی شود .

محل گزش را دستکاری و یا مک نزنید .

اگر فرد آسیب دیده ، کودک پنج ساله یا کوچکتر است به پزشک مراجعه کنید .

به دلیل احتمال بروز شوک و مشکلات تنفسی بیمار باید در بیمارستان تحت نظر باشد.

علائم شوک:

• بروز کهمیر و خارش

• انسداد راه هوایی و خرخر تنفسی

عقرب گزیدگی :

عقرب جاننداری است که در تمام دنیا یافت می شود . این جاندار معمولا در اطراف خانه ها و در محل های خلوت ، زیر وسایل چوبی مخفی و شبها برای شکار از محل اختفا خارج می شود .

این جاندار حالت تهاجمی نداشته و ترجیح می دهد فرار کند تا این که نیش بزند .

معمولا از ظاهر عقرب نمی توان پی برد که سمی است یا نه ؟ علائم و شدت مسمومیت ناشی از عقرب گزیدگی به نوع و بزرگی عقرب و همچنین شرایط جسمی و سنی مصدوم بستگی دارد .

علائم عقرب گزیدگی :

علائم معمولا با درد و سوزش فوری در محل گزش شروع می شود ، گاهی درد به نواحی بالای محل گزش انتشار می یابد ، تعدادی از بیماران علائم شدیدی مثل اختلال در بلع ، سفتی عضلات و پرش و بی قراری در اندام ها پیدا می کنند .

فشار خون ممکن است افزایش یابد و گاهش ضربان قلب مصدوم کاهش یا افزایش شدید می یابد. علائم معمولا به سرعت در محل گزش شروع می شود ، تا پنج ساعت بعد اوج می گیرد و تا ۲۴ ساعت ادامه می یابد . اگر پس از پنج ساعت بیمار علامت جدی بجز درد در محل نداشته به این معناست که گزش چندان جدی نبوده است .

درمان عقرب گزیدگی:

بیمار باید در اولین فرصت به بیمارستان رسانده شود ، نیاز است آزمایش های خاصی برای بیمار انجام شود .

درمان به طور عمده حمایتی است و درد با مسکن ، گذاشتن یخ و بی حرکتی اندام گزیده بهبود نسبی پیدا می کند . پانسمان محل گزیدگی و بالا نگه داشتن آن به کنترل درد کمک می کند .

برای انواع عقرب ها پاد زهر وجود دارد ، اما استفاده از آن عوارض خاص و گاه شدیدی دارد ، به همین دلیل پاد زهر تنها در موارد شدید و بالاخص در کودکان تجویز می شود .

در بیشتر موارد عقرب گزیدگی می توان درمان خانگی انجام داد .

در صورت مشاهده نیش در محل گزش باید آن را با لبه یک چاقو یا کارت اعتباری به آرامی و دقت بیرون بکشید.

نیش را در امتداد پایه آن از محل خارج کنید تا از شکسته شدن آن در زیر پوست جلوگیری گردد.

هرگز نباید نیش را توسط موچین یا پنس و نوک انگشتان فشار دهید زیرا باعث می شود که باقیمانده زهر نیز به داخل فرو رود.

هر گونه زیور آلات را خارج کنید . زیرا تورم بافت آسیب دیده ممکن است گردش خون را دچار مشکل کند .

پس از شناسایی محل گزش آن را پایین تر از سطح قلب قرار داده یک باند تنگ را حدود ۱۰ سانتی متر بالاتر از ناحیه آزرده ببندید تا از جذب سیستمیک سم بکاهد.

محل عقرب گزیدگی را با آب و صابون بشویید .

به منظور کاهش تورم و درد از کمپرس سرد استفاده کنید ، ده دقیقه کمپرس کنید و ده دقیقه کمپرس را بردارید.