



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی

مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام خمینی (ره)

علل خونریزی در نیمه دوم بارداری

واحد آموزش مرکز آموزشی پژوهشی درمانی

امام خمینی (ره)

اردیبهشت ۱۴۰۵

کد سند: p-mn-83

عوامل افزایش دهنده خطر:

- ⇐ زیاد بودن فشارخون
- ⇐ سیگار کشیدن
- ⇐ سن بالاتر از ۳۵ سال
- ⇐ زیاد بودن تعداد بارداری های قبلی
- ⇐ وارد آمدن ضربه به رحم
- ⇐ وجود یک بیماری مزمن مثل دیابت (مرض قند)
- ⇐ مصرف الکل و مواد مخدر به خصوص کوکائین

درمان

اگر کندگی کوچک وخفیف باشد و ضعیف جنین و مادر خوب باشد مادر به شرط بررسی و معاینات منظم و پی در پی مرخص می شود تا جنین رسیده شود. ولی اگر کندگی وسیع باشدو شرایط مادر و جنین خوب نباشد سزارین یا زایمان طبیعی باید انجام شود.

منبع: بارداری و زایمان ویلیامز

شماره تماس: ۰۵۸۳۶۲۲۴۰ (داخلی بخش زنان ۱۲۱)

چسبندگی های داخل رحمی ناشی از برش هایی مثلا به خاطر سزارین و... موارد مشابه از دیگر علل هستند. خانم هایی که یک بار سزارین داشته اند. ۶ برابر بیشتر از بقیه خانم ها ممکن است به این مشکل دچار شوند.

کندگی جفت

در این حالت جفت زود تر از موقع از محل خود جدا می شود. از آنجایی که اکسیژن و مواد غذایی از طریق جفت به جنین میرسد،کنده شدن کامل جفت برای جنین بسیار خطرناک و کشنده است.

علائم کنده شدن زودتر جفت

درد شکم و رحم که ممکن است گاهی اوقات با خونریزی هم همراه باشد میزان کنده شدن جفت اگر کمتر از چند سانتی متر باشد معمولا بی اهمیت بوده ولی جدا شدن کامل جفت برای مادر و جنین کشنده است.

علل کنده شدن جفت

هنوز علت مشخصی پیدا نشده است.

مددجوی عزیز :

با سلام و آرزوی سلامتی برای شما. این بیمارستان یک مرکز آموزشی درمانی می باشد که دارای دانشجویان و فراگیران رشته های پرستاری، مامایی و فوریت می باشد که در شیفتهای متعدد در حال آموزش می باشند و دانشجویان در تمام فرایند تشخیص و درمان و مراجعات بعدی شما تحت نظارت مربیان و اعضای هیات علمی نقش دارند.

این پمفلت آموزشی جهت افزایش اطلاعات شما در مورد مراقبت های لازم و پیشگیری از عوارض آن در اختیار شما قرار گرفته است. با اینکه اغلب خانم ها در صورت داشتن لکه بینی و خونریزی آن را در ابتدای حاملگی تجربه می کنند، گاهی ممکن است لکه بینی و خونریزی در ماه های آخر نیز اتفاق بیفتد.

علل خونریزی در نیمه دوم بارداری

*در سه ماهه دوم و سوم اگر مادر خونریزی داشته باشد دو تشخیص محتمل است:

⇐ جفت سر راهی

⇐ کندی جفت

که باید مادر سریع به بیمارستان منتقل شود.

جفت سر راهی

جفت سر راهی زمانی رخ می دهد که تمام یا قسمتی از جفت نوزاد دهانه رحم (که محل خروج جنین است) را مسدود می کند. این امر باعث خونریزی شدید قبل یا طی زایمان می شود و معمولا با درد همراه است. در اغلب بارداری ها جفت به بالا یا کنار رحم متصل است. در جفت سر راهی، جفت به قسمت پایینی رحم چسبیده است. فرد دارای جفت سر راهی برای مدتی باید استراحت مطلق داشته باشد و احتمالا برای زایمان ایمن نوزاد، نیاز به انجام سزارین دارد.

علائم:

دفع خون قرمز روشن و بدون درد طی نیمه دوم بارداری، علامت اصلی جفت سر راهی است. میزان خونریزی می تواند کم یا زیاد باشد این خونریزی معمولا بدون درمان خاصی متوقف می شود، ولی معمولا چند روز تا چند هفته بعد دوباره اتفاق می افتد. بعضی از زنان کمی درد و انقباض را نیز تجربه می کنند. جفت سر راهی از طریق سونوگرافی قابل تشخیص است.

درمان

جفت سر راهی در اکثر موارد با پیشرفت حاملگی و بزرگ شدن رحم کم کم به سمت بالا کشیده می شود و خود به خود بر طرف می شود به بیماران دارای جفت سر راهی توصیه می شود. تاجهت کاهش خطر فرضی خونریزی جدی پیش از زایمان استراحت مطلق داشته و از فعالیت های فیزیکی و فعالیت های جنسی خود داری کنند.

در صورت بروز خونریزی شدید و به خطر افتادن جان مادر و جنین پزشک مجبور است به حاملگی خاتمه دهد و نوزاد به طریق سزارین خارج کند حتی اگر جنین بسیار نارس بوده و زنده ماندن وی خارج از رحم ممکن نباشد. ولی اگر خونریزی قطع شود و حال مادر و جنین خوب باشد می توان تا رسیده تر شدن جنین صبر کرد.

علل ایجاد جفت سر راهی

علت اصلی جفت سر راهی ناشناخته است. اما تعدادی عوامل شامل نقص رگ های رحم، تخمک گذاری تاخیری و آسیب قبلی رحم دخیل هستند. حاملگی